

# ワクチンデビューは、生後2か月の誕生日!!

予防接種  
スケジュール例

| 通知が届く時期          | ワクチン名とその種類                                        | 誕生 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳                                                        | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
|------------------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 生後1～2か月頃<br>(月末) | <b>生ワクチン</b> ロタウイルス (飲むワクチンです) <b>定期</b> 1価<br>5価 |    |     | ①   | ②   |     |     |     |     |     |     |      |      | 1価ワクチンと5価ワクチンの2種類があり<br>どちらも、初回接種を出生14週6日までにする。           |    |    |    |    |    |
|                  | <b>不活化ワクチン</b> 小児用肺炎球菌 <b>定期</b>                  |    |     | ①   | ②   | ③   |     |     |     |     |     |      |      | 27日以上の間隔をあけて3回接種をしたあと60日以上あけ、<br>かつ1歳～1歳3か月の頃に4回目の接種をする。  |    |    |    |    |    |
|                  | <b>不活化ワクチン</b> 五種混合 <b>定期</b>                     |    |     | ①   | ②   | ③   |     |     |     |     |     |      |      | 20日～56日の間隔をあけて3回接種をしたあと<br>6～18か月後に4回目の接種をする。             |    |    |    |    |    |
|                  | <b>不活化ワクチン</b> B型肝炎 <b>定期</b>                     |    |     | ①   | ②   |     |     |     |     | ③   |     |      |      | 27日以上の間隔をあけて2回接種をしたあと、1回目の接種から<br>139日以上の間隔をあけて3回目の接種をする。 |    |    |    |    |    |
|                  | <b>生ワクチン</b> BCG <b>定期</b>                        |    |     |     |     |     |     |     | ①   |     |     |      |      | 標準的な接種期間は<br>5か月～8か月です。                                   |    |    |    |    |    |
| 1歳になる頃<br>(月末)   | <b>生ワクチン</b> 麻しん・風しん1期 <b>定期</b>                  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 1歳になったら、できるだけ<br>早く受けるようにしましょう。                           |    |    |    |    |    |
|                  | <b>生ワクチン</b> 水痘 <b>定期</b>                         |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 1回目から3か月以上(標準的には6か月～12か月の<br>間隔を)あけて、2回目を接種しましょう。         |    |    |    |    |    |
|                  | <b>生ワクチン</b> おたふくかぜ <b>任意</b>                     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 2回接種が望ましいとされていますが、2回目の<br>接種費用は全額自己負担となります。               |    |    |    |    |    |
| 3歳になった月<br>(月末)  | <b>不活化ワクチン</b> 日本脳炎1期 <b>定期</b>                   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 6日～28日の間隔をあけて2回接種をしたあと、<br>おおむね1年後に3回目の接種をする。             |    |    |    |    |    |
| 就学1年前の春          | <b>生ワクチン</b> 麻しん・風しん2期 <b>定期</b>                  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 接種できる時期は5歳から7歳未満で就学前の<br>1年間のみです。忘れずに受けましょう!!             |    |    |    |    |    |



**定期** 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。  
**任意** 任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。

公費負担で受けることができる期間  
※「NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会」作成資料を参考にしています。

敦賀市健康推進課  
「健康センターはびふる」 TEL.0770-25-5311